

وزارت جهاد کشاورزی
معاونت باغبانی - دفتر طرح زیتون

دستور العمل فنی تغذیه باغهای زیتون

۱- محلولپاشی تشکیل میوه (fruit set):

در باغهای بارده برای افزایش درصد لقاح، تشکیل میوه و جلوگیری از ریزش گلها حتماً لازم است هر سال دو بار محلول کودی زیر محلولپاشی شود.
بار اول در شهریور یا مهرماه پس از برداشت میوه بار دوم در اسفند یا فروردین ماه و بهنگام تورم جوانه ها

✓ اوره ۲ در هزار+ سولفات روی ۲ در هزار+ اسید بوریک ۵ در هزار

لازم به ذکر است که تجویز عنصر بر برای درخت زیتون به دلیل حساسیت درخت و ایجاد برگ سوزی منوط به آزمایش آب و عدم وجود سمیت بر در آن مخصوصاً در خاکهای شور و رعایت نکات لازم هنگام محلولپاشی از جمله زمان مناسب محلولپاشی، آبیاری باغ قبل از محلولپاشی، استفاده از مواد مویان و ... طبق نظرات کارشناسان می باشد.

۲- تغذیه درختان بصورت چالکود:

به منظور افزایش توان مصرفی درخت و سهولت در دسترسی عناصر مورد نیاز در باغهای میوه، استفاده از روش تغذیه چالکود توصیه می گردد که مقادیر مصرفی کودها در این روش تغذیه به عوامل مختلف از جمله نتایج آزمون خاک و تجزیه برگ، سیستم آبیاری ، بافت خاک، سن درخت، و... بستگی دارد ولی عموماً فرمول کودی زیر برای درختان زیتون یک باغ بارور به شرح زیر پیشنهاد می گردد.

✓ ۲۵۰+۲۵۰ گرم نیتروژن به ازاء هر درخت از منبع اوره یا نیترات آمونیم.×

✓ ۵۰۰ گرم فسفر به ازاء هر درخت از منبع سوپر فسفات یا فسفات آمونیم.

✓ ۵۰۰ گرم پتاسیم به ازاء هر درخت از منبع سولفات پتاسیم

✓ ۱۰۰ گرم آهن به ازاء هر درخت از منبع سولفات آهن

✓ ۱۵۰ گرم گوگرد ازاء هر درخت (در خاکهای با Ph بالای ۸)

✓ کود دامی کاملاً پوسیده ۳۰ کیلوگرم

زمان مناسب اجرای چالکود:

✓ کودهای فسفر، پتاسیم ، آهن و گوگرد در فصل پاییز

✓ × کودهای ازته در دو قسط یکی در فصل پاییز همراه سایر کودها و یکی از اوایل تابستان میباشد.

